

國立和美實驗學校消毒劑使用指引

消毒劑的使用(摘自 2006 年 WHO 感染控制指引)

健康中心泡製漂白水消毒方式:

含氯的市售漂白水約 5%次氯酸鈉的 1 漂白水:100 自來水稀釋後則是 0.05%或 500 ppm 為有效氯。稀釋後的漂白水在不同接觸時間(10 分鐘~ 60 分鐘)皆有作用。

健康中心建議:

- ◆ 若消毒一間教室大小的課桌椅約泡製 4000CC~5000CC 的量。
- ◆ 若消毒一間教室大小的地面約可泡製到 10000CC 的量。
- ◆ 若消毒個人桌面或小單位約泡製 1000CC 以下的量。

消毒劑藥水發放地點:

單位	發放地點	負責人員
高中部	研發處	辦公室內教師
特教部	教師助理員辦公室	教師助理員
綜職科	健康中心	護理師
各處室	健康中心	護理師
住宿區	宿舍一樓	住宿生管理員

漂白水(消毒劑)正確使用消毒方法

1、基本步驟：「穿、稀、擦、停、沖、棄」六步驟：

- * 「穿」：穿戴上口罩及手套，保護雙手。
- * 「稀」：各職員工生依校方指定地點領取稀釋溶液或依比例配置溶液。
- * 「擦」：以擦拭方式擦地板、洗手台、水龍頭、馬桶、門把、桌椅等常接觸區域。
- * 「停」：擦拭後，靜置十五至二十分鐘，等待漂白水確實發揮殺菌功效。
- * 「沖」：用清水沖洗或擦拭方才清潔殺菌的區域。
- * 「棄」：可採用以下二種方法

■將用過的漂白水再用大量的水稀釋一遍（不要少於一百倍）才倒入廚房污水道或戶外水溝，比較不會污染水源。

■將漂白水密封存起來，時間久了漂白水會自動氧化再倒掉。

2、清潔步驟：

- (1) 請戴手套。
- (2) 室內要先擦拭、清洗或打掃後再用稀釋漂白水擦拭。
- (3) 先擦拭小東西，如：花瓶、玩具、電話機、滑鼠、鍵盤…。
- (4) 擦拭桌椅、櫥櫃、廚房流理台、水龍頭。
- (5) 接著擦拭地板。
- (6) 再清潔廁所、馬桶、浴缸、牆壁。
- (7) 最後將剩餘的漂白水灑洗陽台、庭院等細菌較多的地方。

3、使用漂白水消毒注意事項：

- 家居至少每日消毒一次，消毒方式是用擦的，勿用噴的，且要保持通風。
- 清潔電器開關和電腦設備時，務必小心避免觸電。
- 漂白水的使用除加水稀釋外，絕不可以滲雜肥皂、藥劑、香料等，否則可能會產生強烈氧化作用，散發出毒性物質。
- 漂白水如果不小心碰觸到眼睛，要用大量清水連續沖洗十五分鐘，如果碰到皮膚，要立刻用清水沖到覺得乾淨為止。
- 使用完後的漂白水，最好不要直接倒入馬桶，如此會使化糞池失去污水處理功能，致污水排出後污染水源。
- 裝漂白水的瓶子應標示清楚，切勿用汽水保特瓶或任何飲料瓶子裝漂白水，避免小孩不小心誤喝。

存放注意：避免靠近高溫，開封一年內用完

- 漂白水開封後，最好在半年至一年內用完；另外，存放3個月後，使用時可稍為提高漂白水比例。因存放時間愈長，分解量愈多，殺菌能力可能降低。
- 漂白水稀釋後，應盡快使用，最好在24小時內使用，以確保其殺菌效能。
- 未經稀釋的漂白水在陽光下會釋出有毒氣體，應存放在陰涼乾爽的地方，避免陽光照射或靠近高溫地方，以及應存放在兒童無法接觸的地方。